



# فهرس الكتاب

كيفية قراءة الروشنة .....	3
اختصارات الروشنة .....	5
روشنتات الأطفال .....	9
روشنتات نساء و توليد .....	19
روشنتات رمد .....	27
روشنتات عظام .....	39
روشنتات مخ وأعصاب .....	46
روشنتات أسنان .....	49
روشنتات أنف وأذن وحنجرة .....	51
روشنتات جلدية .....	53
روشنتات قلب .....	56
روشنتات باطنة .....	63
الختام .....	71

## كيفية قراءة الروشتة هو أول شئ تريد معرفته كصيدلي حديث التخرج

سنتعلم أولاً الخطوات الأساسية التي يمكنك من قراءة أي روشتة بكل سهولة إذا اتبعت هذه الخطوات و طبقتها عملياً .  
وبعد ذلك سنقوم بعرض العديد من الأمثلة لروشتات في مختلف المجالات الطبية للتدريب علي كيفية قراءتها وفهمها جيداً  
حرصاً منا علي تدريب الصيادلة حديثي التخرج و إمدادهم بالقدر الكافي من المعلومات في بداية حياتهم العملية .

### الخطوة الأولى

#### التركيز علي تخصص الطبيب أولاً

فمعرفة تخصص الطبيب سيجعلك تربط بين الأدوية المكتوبة و بين الغرض العلاجي مثال علي ذلك

#### Flagyl Tab

قرص ٣ مرات يومياً

إذا وجدت هذا الصنف في روشتة باطنة فإن الغرض منه هو استخدامه كمطهر معوي في حالات الاسهال و التسمم الغذائي  
أما إذا وجدت هذا الصنف في روشتة أسنان فإن الغرض منه هو استخدامه كمضاد للطفيليات و البكتيريا الاهوائية فيستخدم  
في حالات الخراج و التهابات اللثة

أما إذا وجدت هذا الصنف في روشتة نسا فإن الغرض منه القضاء علي التهابات المهبل

إذن فإن تخصص الطبيب المكتوب علي الروشتة سيرشدك بشكل كبير إلي نوع العلاج والغرض منه لتوعية المريض به  
لاحظ أن الروشتات تأتي إليك مكتوبة بخط اليد برموز و اختصارات في الأغلب تكون غير واضحة مما يضع احتمالات كثيرة  
للخطأ إذا لم تكن واعياً

فمعرفتك لتخصص الطبيب سيجعلك تستبعد الأدوية الخاطئة من تلقاء نفسك

### الخطوة الثانية

#### معرفة شكوي المريض و التحدث معه بطلاقة

لكي تتمكن من معرفة سبب مرضه الحقيقي مما يسهل عليك معرفة الأصناف المكتوبة

مثال : شخص يعاني من انتفاخات دائماً مع وجود إسهال

فسرعان ما يأتي لذهنك أنه مريض قولون و بقراءة الروشتة ستجد بالفعل أدوية مضادة للتقلصات

## الخطوة الثالثة

### ألا تتسرع في قراءة الروشنة

فبعد أن تقرأ التشخيص و تفهم شكوي المريض جيداً خذ وقتك المناسب لتجميع الأدوية و التأكد منها و لا تتسرع أبداً لأن الخطأ في قراءة الروشنة سيكلفك الكثير

## الخطوة الرابعة

### معرفة سن المريض

للتأكد من الجرعة المناسبة حتي وإن كانت مكتوبة فمن واجبك كصيدلي التأكد من صحة الجرعة إذا كانت المريضة أنثى و الروشنة بها لبوس مهلبلي فيجب التأكد إذا ما كانت أنسة أم متزوجة

## الخطوة الخامسة

### التأكد من الشكل الدوائي للدواء المكتوب بالروشنة

سواء أقراص أو شراب أو حقن أو غيرها و يمكنك معرفة أشكال الدواء بالتفصيل في [هذا الموضوع](#) وذلك أمر مهم حيث أنك كصيدلي لا يجوز أن تعطي دواء شرب بدلاً من أقراص أو حقن فيجب الانتباه للشكل الدوائي المكتوب

## الخطوة السادسة

### الانتباه إلي تاريخ الروشنة

فبعض المرضى يكررون العلاج المكتوب دون الرجوع إلي الطبيب المعالج في حين أن الطبيب قد أوصي باستخدامه لمدة معينة و إيقافه بعدها

فيجب تنبيه المريض إلي ذلك الأمر إذا وجد خطراً عليه من تكرار العلاج

## الخطوة السابعة

### لا تجازف أبداً

إذا كنت غير واثق من إحدى العلاجات ولو بنسبة ضئيلة و لم تستطع قرانته جيداً فلا تصرفه أبداً

لأن الخطأ في تناول الأدوية يعرض المريض للخطر

إنك تتعامل مع صحة المريض وهي أعلى النعم لذلك في هذه الحالة تواصل مع الطبيب المعالج لتتأكد منه بنفسك .

# اختصارات الروشنة

اختصارات الروشنة الطبية من الأمور المهمة جداً التي يجب علي كل صيدلي حديث التخرج أن يكون علي وعي كامل بها ليستطيع صرف الروشنة بالشكل الصحيح دون الوقوع في أخطاء

هذا هو الموضوع الثاني الذي سنتطرق إليه قبل عرض الروشنتات الطبية و التدريب عليها .

بعد أن تعرفنا سابقاً علي مجموعة النصائح المهمة الواجب إتباعها لقراءة الروشنة سنتعرف اليوم علي الاختصارات التي تُكتب دائماً في الروشنتات و معني كل اختصار فيها لكي تتمكن من فهم الروشنة و صرف الدواء الصحيح .

## أول اختصار ستلاحظه هو

### RX , R/

وهذا الاختصار يعني **العلاج الذي سيكتب للمريض** فلا يختلط عليك الأمر و تعتقد إنه جزء من اسم الدواء

ثانياً ستلاحظ وجود اختصارات بعد اسم الدواء توضح الشكل الدوائي لكل صنف مكتوب

## وهذه الاختصارات كالاتي :

**tabs** >> الأقراص

**caps** >> الكبسولات

**Syp** >> الأشربة

**Susp** >> شراب معلق

**Eff** >> فوار

**Sach** >> أكياس

**Supp** >> لبوس

**Spray** >> بخاخ

**Amp** >> الأمبولات

**Vial** >> حقن تحتوي علي بودر

**Ear.dp , ED** >> نقط الأذن

**Eye.dp , ED** >> نقط العين

**Eye.oint** >> مرهم عين

**N.dp , Nasal drops** >> نقط الأنف

**Oral.dp** >> نقط الفم

**N.spray** >> بخاخ الأنف

**Oint** >> المرهم

**Cr\_** >> الكريم

**Lotion** >> لوسيون

**Pd** >> بودر

**m.w** >> مضمضة

**Vag.supp , Vag.ovule** >> لبوس مهبلية

**Enema** >> حقنة شرجية

**Douch** >> دش مهبلية

وهناك بعض الاختصارات لطريقة إعطاء الحقن مثل

**S.C >> Sub cutaneous**

أي تحت الجلد

**IM >> intra muscular**

أي في العضل

**IV >> intra venous**

أي في الوريد

ملحوظة هامة

**حقن العضل لا يمكن أبداً إعطاؤها في الوريد ممنوع منعاً باتاً**

لأن جزيئات الدواء المصممة للدخول في العضل يختلف حجمها عن جزيئات الدواء المسموح بدخولها في الوريد وتركيز المواد مختلف في الحالتين

كذلك حقن العضل التي تحلل بمادة ليدوكاينين إذا تم إعطاؤها بالخطأ في الوريد لشخص طبيعي فإنها تسبب أضراراً جسيمة بعضلة القلب (عدم إنتظام ضربات القلب) و من الممكن أن تؤدي إلي الوفاة

لذلك انتبه عند إعطاء الحقن إذا ما كانت عضل أو وريد

أما إذا تم إعطاء حقنة الوريد في العضل بالخطأ ففي أغلب الأحوال لا مشكلة ولكن تذكر دائماً

**حقن العضل مصممة لإعطاؤها في العضل و حقن الوريد مصممة لإعطاؤها في الوريد**

أما الآن سنتحدث عن نوع آخر من اختصارات الروشتة الطبية وهو الجرعات تُكتب الجرعات الطبية في الروشتة بطريقة مختلفة فستلاحظ وجود أرقام وعلامات مثال علي ذلك

**Flagyl tab**

**1x2**

أي قرص مرتين في اليوم

أما إذا كان هناك رقم ثالث فإنه يدل علي مدة الكورس العلاجي مثال

**Flagyl tab**

**1x2x7**

أي قرص مرتين في اليوم لمدة ٧ أيام

يجب أن تكون علي وعي كافي بالجرعة المناسبة لكل دواء و توجيه المريض للجرعة الصحيحة حسب توجيهات الطبيب المعالج

هذه هي كل الاختصارات الطبية التي من الممكن أن تواجهها بداخل الصيدلية و قد حرصنا علي تبسيط المعلومات قدر الإمكان ليستفيد منها الجميع .

بعد أن قمنا بشرح كيفية قراءة الروشتة

و اختصارات الروشتة

سنبدأ الآن بتجميعه روشتات في مختلف المجالات الطبية لتدريب الصيادلة حديثي التخرج علي قراءة و فهم الروشتة التي تعتبر الأساس المهم للوقوف في الصيدلية والتعامل مع المريض .

وقد قمنا بتجميعها بعناية وشرحها بالتفصيل حرصاً منّا علي تقديم القدر الكافي من المعلومات الصحيحة والخبرة التي اكتسبناها علي مدار سنوات بشكل مُبسّط و مفيد للجميع .

و سيتم تقسيم هذه الروشتات إلي أقسام مختلفة فستجد في هذا الكتاب :

قسم روشتات باطنة

قسم روشتات قلب

قسم روشتات أطفال

قسم روشتات رمد

قسم روشتات نساء و توليد

قسم روشتات الأسنان

قسم روشتات المخ و الأعصاب


إلي آخره من أقسام و سيتم تحديث هذا الكتاب شهرياً لإضافة الروشتات الجديدة التي يتم كتابتها بشكل دوري علي موقعنا

Pharmacy Cafe



# روشتات الأطفال

## الروشتة الأولى



التخصص : روشتات اطفال

الاصناف المكتوبة كالاتي

**Rony gar sachets**

**A.C : Agar agar**

الجرعة : يُضاف نصف كيس إلي ٥ سم ماء مقطر كل ٦ ساعات

الاستخدام : اكياس روني جار تستخدم لعلاج مرض الصفرا لدي الاطفال حديثي الولادة

## **Vidrop oral drops**

**A.C : Cholecalciferol**

الجرعة : ٤ نقط كل ٢٤ ساعة

الاستخدام : نقط فيدروب هي عبارة عن فيتامين د (كوليكالسيفيرول) وهو أحد الفيتامينات المهمة التي تساعد علي امتصاص الكالسيوم و بناء العظام وعادةً ما نستخدم نقط فيدروب للرضع للوقاية من لين العظام و الكساح عند الاطفال


## **Dentinox oral drops**

**A.C : Antifoam M**

الجرعة : ٢ سم كل ١٢ ساعة

الاستخدام : دنتينوكس نقط تستخدم لعلاج المغص لدي الرض

## الروشتة الثانية



التخصص : روشتات اطفال

الاصناف المكتوبة كالاتي

### Peopospan syrup

A.C : Ivy leaves

الجرعة : ٢ سم ٣ مرات يومياً

الاستخدام : بيوبوسبان شراب هو موسع للشعب الهوائية و هو عبارة عن أعشاب تستخدم لتهدئة الكحة لدي الاطفال

### Ambroxol oral drops

A.C : Ambroxol

الجرعة : ٥ نقط ٣ مرات يومياً

الاستخدام : تستخدم نقط امبروكسول كمذيب للبلغم لدي الاطفال

## **Zithromax 600 mg syrup**

**A.C : Azithromycin**

الجرعة : ٣ سم مرة واحدة في اليوم

الاستخدام : زيثروماكس ٦٠٠ مجم شراب هو مضاد حيوي من عائلة الماكروليد و مادته الفعالة ( ازيثرومايسين ) و التي تستخدم كمضاد حيوي لعلاج التهاب الشعب الهوائية في هذه الحالة


## **Camisan cream**

**A.C : Chamomile**

الجرعة : دهان عند اللزوم

الاستخدام : كاميزان كريم يستخدم كمرطب لالتهابات الحفاضات لدي الرضع

## الروشتة الثالثة



التخصص : روشتات اطفال

الاصناف المكتوبة كالاتي

### **Fenistil oral drops**

**A.C : Dimetindene maleate**

الجرعة : ٦ نقط ٣ مرات يومياً

الاستخدام : تستخدم نقط فنستيل لعلاج نزلات البرد و تخفيف العطس و الرشح لدي الرضع حيث أن نقط فنستيل مضادة للحساسية

سواء حساسية الانف أو الحساسية الموسمية كذلك تستخدم في علاج حساسية الجلد

## **Farcotilium syrup**

**A.C : Domperidone**

الجرعة : ١,٥ سم كل ٨ ساعات

الاستخدام : فاركوتيليوم شراب هو مضاد للقيء كما إنه يستخدم كمنظم لحركة المعدة و الامعاء


## **Cevilene oral drops**

**A.C : Vitamin C**

الجرعة : ٦ نقط ٣ مرات يومياً

الاستخدام : تستخدم نقط سيفيلين كمصدر لفيتامين سي للرضع

## الروشتة الرابعة



التخصص : روشتات اطفال

الاصناف المكتوبة كالاتي

**Ondametic amp.**

**A.C : Ondansetron**

الجرعة : نصف سم كل ١٢ ساعة

الاستخدام : حقن اونداميتك تستخدم كمضاد للغثيان و القي

**Bactrix 1.5 gm vial**

**A.C : Cefoperazone + Sulbactam**

الجرعة : تحلل في ٤ سم و يُعطي ١ سم كل ١٢ ساعة

الاستخدام : حقن باكتيريكس هي حقن مضاد حيوي من الجيل الثالث لها استخدامات متنوعة

فهي تستخدم في حالات :

التهاب الحلق

التهاب اللوزتين

الالتهاب الرئوي

التهاب الشعب الهوائية

حالات التسمم الغذائي

الالتهاب السحائي

و غيرها من حالات الالتهاب

**Antinal syrup**


**A.C : Nifuroxazide**

الجرعة : ٢ سم كل ٨ ساعات

الاستخدام : انتينال شراب يستخدم كمطهر معوي و لوقف حالات الاسهال لدي الاطفال



## الروشتة الخامسة



التخصص : روشتات اطفال

الاصناف المكتوبة كالاتي

### **Kemoxon 1 gm vial**

**A.C : Ceftriaxone**

الجرعة : ٢ سم كل ١٢ ساعة

الاستخدام : حقن كيمبوكسون هي حقن مضاد حيوي من عائلة السيفالوسبورين الجيل الثالث و مادتها الفعالة هي سيفترياكسون و التي تستخدم كمضاد لالتهاب الشعب الهوائية

### **Ambroxol oral drops**

**A.C : Ambroxol**

الجرعة : ٢٥ نقطة في اليوم

الاستخدام : تستخدم نقط امبروكسول كمذيب للبلغم لدي الاطفال

## **Averozolid 100 mg syrup**

**A.C : Linezolid**

الجرعة : ٥ سم كل ١٢ ساعة

الاستخدام : أفيروزوليد شراب هو مضاد حيوي يستخدم في حالات العدوي البكتيرية الشديدة والتي تكون مقاومة للمضادات الحيوية الأخرى

## **Coughsed paracetamol infant supp**


**A.C : Gelsemium extract + grindelia extract + niaouli**

الجرعة : مرة واحدة ليلاً

الاستخدام : لبوس كافسيد باراسيتامول للرضع يستخدم لعلاج للسعال حيث أنه طارد للبلغم كما أنه خافض للحرارة لأنه يحتوي علي باراسيتامول تلك المادة الآمنة للرضع والتي تستخدم لخفض حرارة الرضيع

# روشتات نساء و توليد

## الروشتة الاولى



التخصص : روشتات نساء وتوليد

الاصناف المكتوبة كالاتي

**Respatio 20mg tab**

**A.C : Sildenafil**

الجرعة : قرص بعد الافطار و العشاء

استخدامه : تستخدم أقراص ريسباتيو ( سيلدينافيل ) أثناء الحمل في حالات نقص وزن الجنين إذ أنه يعمل علي توسيع المشيمة و زيادة الامداد الدموي للجنين مما يؤدي إلي زيادة وزن الجنين و تتم متابعة وزن الجنين بدءاً من الشهر الرابع من فترة الحمل

**Dexamethasone 8mg amp.**

## A.C : Dexamethasone sodium phosphate

الجرعة : حقنة عضل كل ١٢ ساعة لمدة يومين

استخدامها : تستخدم حقن ديكساميثازون ( وهي حقن كورتيزون ) في الفترة الاخيرة من الحمل إذ أنها تساعد علي اكتمال نمو رنتي الجنين و تؤخذ بجرعة معينة يحددها الطبيب و تكون قبل الولادة بأيام قليلة و دائماً ما يتم كتابتها في روستات نساء وتوليد

## Clexane 40mg s.c

### A.C : Enoxaparin sodium

حقنة تحت الجلد مرة واحدة يومياً

الاستخدام : تستخدم حقن كليكسان للحوامل لمنع حدوث الجلطات

و هذا الأمر في غاية الاهمية إذ تعاني بعض الحوامل من تجلط الدم بصفة مستمرة الأمر الذي يؤدي إلي عدم وصول الدم بشكل كافي إلي الجنين من خلال المشيمة مما يعرض حياة الجنين للخطورة و يؤدي ذلك الأمر إلي حدوث إجهاض فوراً

لذلك يتم عمل التحاليل فور بدأ الحمل لمعرفة إذا ما كانت الأم تعاني من هذا التجلط أم لا و إذا وجد لديها هذا الأمر نلجأ إلي حقن كليكسان طوال فترة الحمل مرة واحدة يومياً


## Novaldol 1gm tab

### A.C : Paracetamol

قرص عند اللزوم

الاستخدام : تستخدم أقراص نوفالدول ك مسكن عام أثناء فترة الحمل إذ أن مادة الباراسيتامول هي أكثر المواد الفعالة أماناً للحوامل ولا تتسبب في حدوث أي اعراض جانبية و في هذه الروشتة يوصف نوفالدول للصداع عند اللزوم

## الروشتة الثانية



التخصص : روشتات نساء وتوليد

الاصناف المكتوبة كالآتي

### **Zithrocin 500mg 3caps**

**A.C : Azithromycin**

الجرعة : ٢ كبسولة أول يوم ثم كبسولة بعد ٢٤ ساعة

الاستخدام : زيتروسين أقراص هو مضاد حيوي واسع المجال من عائلة الماكروليد وفي هذه الحالة يُستخدم كمضاد التهاب لمجري البول و المثانة

### **Elastic bag**

قربة لعمل كمادات ساخنة أسفل البطن مساءً

### **Aspid 75mg tab**

**A.C : Acetylsalicylic acid**

الجرعة : ٢ قرص بعد الغذاء لمدة ٣ أيام

الاستخدام : تستخدم أقراص اسبوسيد لعمل سيولة في الدم و الحماية من الجلطات

## Folic acid 5mg tab

### A.C : Folic acid

قرص واحد يومياً بدون انقطاع

الاستخدام : أقراص فوليك اسيد عبارة عن فيتامين ب ٩ و هو من الفيتامينات التي تتواجد بكميات صغيرة في الأغذية لذلك يوصي الأطباء بأخذه من أجل الوقاية من الإصابة بالانيميا و يوصف بالانحصار للحوامل لحماية الجهاز العصبي للجنين و منع حدوث التشوهات

## Cystone tab

### A.C : Achyranthes + Cyperus +Didymocarpus + Hajrul yahood

الجرعة : قرص مرتين لمدة ١٠ أيام

الاستخدام : تستخدم أقراص سيستون كمطهر لمجري البول من العدوي البكتيرية التي تظهر في حالة وجود

### pus cells

في تحليل البول

نلاحظ أن هذه الحالة تعاني من ألم أسفل البطن وبذلك يكون تشخيص الحالة وجود أملاح أو حصوات بالمثانة كما أن الطبيب قد أضاف فوار للاملاح وهو

## Epimag eff.

### A.C : Magnesium citrate

الجرعة : كيس فوار علي نصف كوب ماء مرتين يومياً

الاستخدام : يساعد فوار ابيماج علي التخلص من أملاح اوكسلات الكالسيوم الزائدة في البول مما يمنع تكوين الحصوات

## تعليقات على الروشتة

المضاد الحيوي المستخدم في هذه الحالة ليس أفضل اختيار و الأصح استخدام


### **Nitrofurantoin**

**Ex : Mepafuran 100mg caps**

بجرعة ١٠٠ مجم كل ٦ ساعات

ولكن في حالة عمل مزرعة بكتيرية يكون اختيار المضاد الحيوي حسب نتيجة المزرعة .

## الروشتة الثالثة



التخصص : روشتات نساء وتوليد

الاصناف المكتوبة كالآتي

### Spasmofree 50mg tab

A.C : Tiemonium methylsulphate

الجرعة : قرص قبل الأكل مرتين يومياً

الاستخدام : أقراص سبازموفري هي مضادة للمغص و التقلصات

### Klenva vaginal douche

A.C : Alum + Chamomile extract + Thymol + Menthol + Methyl paraben + Citric acid

دش مهبلي كل مساء

الاستخدام : كلينفا هو غسول مهبلي و منظف يساعد علي علاج الاحساس بالحكة و الحرقان



## Haema-caps

A.C : Ferrous fumarate + Vitamins ( B1+ B2 + B6 + B12 + C + D + E )

كبسولة يومياً بعد الغذاء

الاستخدام : هيماكبس هو مكمل غذائي يحتوي علي الحديد بالإضافة إلي فيتامينات أخرى و يستخدم في علاج الانيميا و حالات نقص الحديد

## Sacrofer amp.

A.C : Iron

## Dexamethasone 8mg amp.

A.C : Dexamethasone sodium phosphate

و هذه الحقن قد وصفها الطبيب بالجرعة الآتية : ٣ امبولات سكروفير + امبول ديكساميثازون في محلول ملح مرة اسبوعياً

الاستخدام : حقن سكروفير هي حقن حديد تستخدم في حالات الانيميا و نقص الحديد

حقن ديكساميثازون قد سبق ذكرها و هي حقن كورتيزون


وقد ذكر الطبيب أن يتم خلط الحقنتين معاً و إعطائهم في محلول ملح

## تعليقات على الروشتة

يفضل إعطاء الديكساميثازون قبل محلول الحديد وليس خلطهم معاً

لأنه لا يفضل خلط أي دواء مع الحديد

## الروشتة الرابعة



التخصص : نساء و توليد

العلاجات المكتوبة كالاتي

**Clomid 50mg tab**

**A.C : Clomiphene**

قرصين مرة واحدة يومياً لمدة ٥ أيام

الاستخدام : تنظيم و تحفيز التبويض ( خروج البويضات شهرياً ) لمن تعاني من عدم إنتظام هذه العملية

كذلك يستخدم هذا الدواء في حالات تكيس المبيض

**Pregnyl 5000 U.I amp.**


**A.C : Gonadotropinum ( Human Chorionic Gonadotropin )**

حقنة في اليوم الثاني و الثالث عشر

الاستخدام : تحفيز عملية التبويض لزيادة فرص الإنجاب

# روشتات رمد

## الروشتة الأولى



التخصص : روشتات رمد

الاصناف المكتوبة كالاتي

### Velosef 250mg syrup

A.C : Cephadrine

الجرعة : ٣ سم كل ٦ ساعات

الاستخدام : فيلوسيف شراب هو مضاد حيوي من مجموعة سيفالوسبورين من الجيل الأول يستخدم في هذه الحالة لعلاج التهاب العين

### Maxilase syrup

A.C : Alpha amylase

الجرعة : ٣ سم ٣ مرات يومياً

الاستخدام : يستخدم ماكسيلاز شراب لعلاج الالتهاب والتورم الناتج عن أسباب مختلفة أشهرها الكدمات

## **Tobradex eye ointment**

### **A.C : Dexamethasone + Tobramycin**

الجرعة : دهان مرة واحدة مساء

الاستخدام : مرهم توبراديكس هو مرهم يحتوي علي مضاد حيوي بالإضافة إلي الكورتيزون و يستخدم كمضاد لإلتهابات العين


## **Orchacin eye drops**

### **A.C : Lomefloxacin**

الجرعة : نقط ٣ مرات في اليوم

الاستخدام : قطرة اوركاسين هي قطرة تحتوي علي مضاد حيوي من الجيل الثاني من مجموعة فلوروكين لعلاج التهابات العين الشديدة

## الروشتة الثانية



التخصص : روشتات رمد

الاصناف المكتوبة كالآتي

### **Alphintern tab**

**A.C : Chymotrypsin + trypsin**

الجرعة : قرص ٣ مرات يومياً قبل الأكل بنصف ساعة

الاستخدام : أقراص الفنتيرن تستخدم كمضاد للتورمات و الالتهابات و يجب أن تؤخذ قبل الأكل بنصف ساعة علي الأقل و في حالة نسيان الأخذ قبل الأكل يمكن أخذها بعد الأكل بساعتين

### **Ruta - C tab**

**A.C : Rutin + Vitamin C**

الجرعة : قرص مرتين يومياً

الاستخدام : تستخدم أقراص روتا سي كمقوي للشعيرات الدموية في شبكية العين

## **Orchadexolin eye drops**

**A.C : Chloramphenicol + Dexamethasone + Tetryzoline**

الجرعة : نقط مرتين يومياً

الاستخدام : اوركاديكسولين قطرة تستخدم كمضاد للعدوي البكتيرية


## **Tears guard eye drops**

**A.C : Hydroxypropyl methylcellulose**

الجرعة : نقط ٣ مرات يومياً

الاستخدام : تستخدم قطرة تيرز جارد كمرطب للعين وتسمي بديل الدموع حيث أنها تعالج جفاف العين و تقلل من التهيج و احمرار العينين

## الروشتة الثالثة



التخصص : روشتات رمد

الاصناف المكتوبة كالاتي

### Fluroquinomox eye drops

#### A.C : Moxifloxacin

الجرعة : قطرة للعين اليميني ٣ مرات يوميا لمدة أسبوع

الاستخدام : قطرة فلوروكينوموكس هي قطرة مضاد حيوي لعلاج التهابات العين الناتجة عن العدوي البكتيرية


### Epiteimozal eye drops

#### A.C : Dorzolamide + Timolol

الجرعة : قطرة للعين اليميني كل ١٢ ساعة لمدة أسبوع

الاستخدام : تستخدم قطرة ابيتيموزال لعلاج الجلوكوما و ذلك من خلال تقليل ضغط العين

## الروشتة الرابعة



التخصص : روشتات رمد

الاصناف المكتوبة كالآتي

### **Cerebromap caps**

**A.C : Naftidrofuryl**

الجرعة : قرص بعد الغذاء

الاستخدام : تستخدم اقراص سيربيروماب لتوسيع الاوعية الدموية و زيادة الامداد الدموي لشبكية العين

### **Ocuguard caps**


**A.C : Vitamin C + Nicotinamide + Vitamin B12 + Vitamin E + Ginko biloba + Zinc**

الجرعة : قرص بعد الغذاء

الاستخدام : اقراص اوكيوجارد هي مكمل غذائي للحفاظ علي صحة العين حيث يحتوي علي فيتامينات و معادن مهمة تعمل علي حماية أعصاب العينين



## الروشتة الخامسة



التخصص : روشتات رمد

الاصناف المكتوبة كالاتي

### Optidex eye drops

**A.C : Dexamethasone + Tobramycin**

الجرعة : قطرة ٣ مرات في اليوم بعد رج الزجاجاة

الاستخدام : اوبتيدكس هي قطرة تحتوي علي مضاد حيوي بالإضافة إلي الكورتيزون و تستخدم كمضاد لالتهاب العين

### Solofresh eye drops

**A.C : Sodium hyaluronate**

الجرعة : قطرة خمس مرات يومياً

الاستخدام : تستخدم قطرة سولوفريش كمرطب للعين و تكون جرعتها بهذا الشكل لعلاج جفاف العين الشديد

## **Cornetears eye gel**

### **A.C : Vitamin A palmitate**

الجرعة : مرة واحدة مساءً قبل النوم

الاستخدام : تستخدم كورنيتيرز كمصدر لفيتامين ألف الذي يحمي العين من الكثير من الأضرار


## **Octatron caps**

### **A.C : Biotin + Mixed bioflavonoids + Selenium + Molybdenum + Vitamin ( A + C + E ) + Zinc**

الجرعة : كبسولة مرة واحدة بعد الغذاء

الاستخدام : اوكتاترون أقراص يستخدم كـ مكمل غذائي يحتوي علي العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ألف و سي كذلك السيلينيوم و البيوتين وغيرها من العناصر المهمة للحفاظ علي شبكية العين

## الروشتة السادسة



التخصص : جراحة العيون

الأصناف كالاتي

### Conjclear eye drops

A.C : Olopatadine

قطرة ٥ مرات يومياً

الاستخدام : مضاده لحساسية العين

### Efemyo eye drops

A.C : Fluometholone+Tetrahydrozoline

قطرة ٥ مرات يومياً

الاستخدام

### Non-infection inflammations


## **Fortymox plus eye drops**

**A.C : Dexamethasone+Moxifloxacin**

قطرة ٥ مرات يومياً

الاستخدام : قطرة تحتوي علي مضاد حيوي بالإضافة إلي كورتيزون

## الروشتة السابعة



التخصص : رمد

أحياناً قد تجد روشتة مُحيرة و يصعب عليك قرائتها فبالرغم من أنها تحتوي علي صنف واحد ولكنها غير واضحة

مع استمرار التدريب ستتمكن من قراءة هذه الأنواع من الروشتات

الصنف المكتوب هنا هو

### **Lacritears eye drops**

**A.C : Sodium carboxymethylcellulose**


قطرة ٤ مرات يومياً باستمرار

الاستخدام : قطرة مرطبة للعين (بديل للدموع) و تستخدم في حالات إحمرار العين



# روشتات عظام

## الروشتة الأولى



التخصص : جراحة عظام وعمود فقري

الأصناف كالاتي

### Thiotacid compound 600mg caps

A.C: Thioctic acid (Alpha lipoic acid) + Vitamin B1 + Vitamin B12

كبسولة مرتين يومياً

الاستخدام : مضاد للأكسدة للحفاظ علي خلايا الجسم الطبيعية

### Karbalta 60mg caps

## A.C : Duloxetine

كبسولة مرة واحدة بعد العشاء

الاستخدام : في حالات آلام الأعصاب الطرفية و علاج للتوتر ويستخدم في حالات الأكتئاب

## Neurobion amp.

## A.C : Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12

حقنة عضل كل ٣ أيام

الاستخدام : فيتامين ب ١ ٢ لتقوية الأعصاب

## Calcid caps

## A.C : Calcium carbonate 500mg + Vit D3 200 I.U

قرص بعد الإفطار

الاستخدام : أقراص كالسيوم بالإضافة لفيتامين د

## Devarol-S amp.

## A.C : Cholecalciferol

حقنة كل ٣ أشهر

الاستخدام : علاج حالات نقص فيتامين د و تستخدم بالإضافة للكالسيوم في حالات هشاشة العظام

ويمكنكم قراءة موضوع كاملاً عن هشاشة العظام و طرق علاجه [من خلال هذا الرابط](#)

## Omez 20mg caps


## A.C : Omeprazole

قرص علي الريق صباحاً

الاستخدام : لتقليل الحموضة و علاج قرح المعدة و عادةً ما تُكتب أدوية المعدة في روستات العظام لتغليظ المعدة و الوقاية من القرحة لأن أدوية العظام غالباً ما تسبب ضرر بالمعدة .



## الروشتة الثانية



التخصص : عظام

الأصناف المكتوبة

### **Depovit B12 amp.**

**A.C : Hydroxocobalamin**

حقنة عضل كل ٣ أيام

الاستخدام : حقن ب ١٢ لتقوية الأعصاب

### **Ambezim-G tab**

**A.C : Chymotrypsin+Trypsin**

قرصين مرتين يومياً لمدة ١٠ أيام قبل الأكل بساعة

الاستخدام : مضاد للتورمات و الالتهابات

## **Anoxicam 20mg tab**

**A.C : Tenoxicam**

قرص مرة واحدة بعد الأكل لمدة ١٠ أيام

الاستخدام


**NSAID.OXICAM**

**Pantoflex cream**

دهان مرتين يومياً

الاستخدام : يساهم في إنتاج الكولاجين ، ومسكن لآلام المفاصل والغضاريف

## الروشتة الثالثة



التخصص : عظام

الصنف المكتوب هو

### Comfort gel

**A.C : Menthol + Isopropanol + Triethanolamine + Carbomer + Methyl paraben**

الاستخدام

**Skin soothing & cooling gel**

## الروشتة الرابعة



التخصص : عظام وعمود فقري

الأصناف المكتوبة

**Methoquick 50/500 mg tab**

**A.C : Diclofenac Potassium + Methocarbamol**

قرص مرتين يومياً لمدة ٢١ يوم

الاستخدام

**NSAID anti-inflammatory , antipyretic and analgesic**

**Divido 75mg caps**

**A.C : Diclofenac Sodium**

قرص مرتين يومياً لمدة ٢١ يوم

الاستخدام

**NSAID for treatment of signs of Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis**

## Genuphil tab

A.C : Chondroitin + Glucosamine + Methyl sulphonyl methane


كبسولة مرة واحدة لمدة ٣ شهور

الاستخدام : لعلاج خشونة المفاصل

لقراءة موضوع كامل عن خشونة المفاصل و طرق علاجها [من هنا](#)

# روشتات مخ وأعصاب

## الروشتة الأولى



التخصص : مخ و أعصاب

الأصناف المكتوبة كالاتي

**Aspocid 75mg tab**

**A.C : Acetylsalicylic Acid**

قرصين يومياً بعد الأكل

استخدامه : للوقاية من الجلطات بتحسين سيولة الدم

**Ator 20mg tab**

**A.C : Atorvastatin**

قرص مساءً مرة واحدة يومياً

استخدامه: لعلاج الكوليسترول و خفض نسبة الدهون

لقراءة موضوع كامل عن الكوليسترول وكيفية علاجه [من هنا](#)  
و نلاحظ أن الطبيب قد نبه بأن تكون هذه العلاجات بشكل مستمر بالإضافة إلي جلسات تخاطب

### **Cerebrolysin 5mg amp.**

**A.C : Cerebrolysin**

حقنة عضل كل ٣ أيام

الاستخدام : لعلاج جلطات المخ

### **Fortamind oral drops 30ml / Cerebroprove oral soln 30ml**

**A.C : Citicholine**

عشرة مللي ٣ مرات

الاستخدام : لعلاج جلطات المخ و بعض الأمراض الأخرى مثل فقدان الذاكرة (الزهايمر) وخلل في الأوعية الدموية نتيجة لصدمة الرأس

### **Memexa 10mg tab**

**A.C : Memantine**

قرص مساءً

الاستخدام

**Antidementia agent in Alzheimer disease , prevent cell degeneration and cell death**

## Neuroton tab

A.C : Vitamin B12+B6+B1+B2+Folic acid

قرص صباحاً

الاستخدام : فيتامين ب ١٢ لتقوية الأعصاب


و هذه العلاجات الأربعة الأخيرة تستخدم لمدة ٣ شهور كما أوصي الطبيب المعالج

هكذا تُترجم الروشتة و تُشرح للمريض بالتفصيل



# روشتات أسنان

## الروشتة الأولي



التخصص : أسنان

الأصناف كالاتي

### Alphintern tab

#### A.C : Chymotrypsin+Trypsin

قرص ٣ مرات يومياً قبل الأكل بساعة

الاستخدام : مضاد للتورمات و الالتهابات

عادة ما يكتبه أطباء الأسنان في أغلب الروشتات لأنه دواء مهم جداً

يساعد علي إزالة التورمات والالتهابات بداخل الفم ، ويجب الالتزام بأخذه قبل الأكل لتظهر فاعليته

وإذا نسي المريض أخذه قبل الأكل ينتظر ساعتين بعد الأكل ثم يأخذه

### Hibiotic 1gm tab

**A.C : Amoxicillin+Clavulanic acid**

قرص كل ١٢ ساعة بعد الأكل

مضاد حيوي واسع المجال

**Flagyl 500mg tab**


**A.C : Metronidazole**

قرص ٣ مرات بعد الأكل

الاستخدام : القضاء علي بكتيريا الأسنان اللاهوائية

# روشتات أنف وأذن وحنجرة

## الروشتة الأولى



التخصص : أنف وأذن وحنجرة  
الأصناف المكتوبة

### **E-Moxclav 625mg tab**

**A.C : Amoxicillin+Clavulanic acid**

قرص مرتين كل ١٢ ساعة بعد الأكل

الاستخدام : مضاد حيوي واسع المجال

### **Fenistil tab**

**A.C : Dimetindene Maleate**

قرص مرة واحدة مساء

الاستخدام : مضاد للحساسية

## **Dexatobrin E.D**



### **A.C: Dexamethasone+Tobramycin**

نقط ٣ مرات بعد الأفاطار (لأنها تُفطر الصائم) لذلك وجب التنبيه

الاستخدام : نقط تستخدم كمضاد حيوي ومضاد للإلتهابات لوجود نسبة من الكورتيزون بها

# روشتات جلدية

## الروشتة الأولى



التخصص : جلدية

الأصناف المكتوبة بالترتيب كالآتي

**Glossy hair shampoo**

**Shampoo with keratin**

شامبو للشعر يوم بعد يوم

استخدامه : للعناية بالشعر حيث أنه يحتوي علي مادة الكيراتين

## Golden style hair lotion

A.C : Glycerol cocoate + Wheat germ oil + Jojoba oil +Olive oil + Eruca sativa

غسول للشعر صباحاً يومياً

استخدامه : لتحسين نمو الشعر و العناية به

## Profero chewable tab

A.C : Iron + Zinc + Folic acid + Biotin + Selenium + Vitamins  
(C+E+A+D3+K+B complex)

قرص بعد الغذاء

استخدامه : أقراص حديد و فيتامينات متعددة

## Depovit B12 amp.

A.C : Hydroxocobalamin

حقنة عضل أسبوعياً ( في الغالب تؤخذ كل ٣ أيام ) ولكن الجرعة تُكتب كما هو بالروشتة

الاستخدام : حقن ب ١ ٢ لتقوية الأعصاب

## Closol spray

A.C : Clotrimazole

سبراي مرتين يومياً

الاستخدام : مضاد للفطريات

**Fungibacid nail soln.**

**A.C : Tioconazole**

مرة واحدة مساءً يومياً

الاستخدام : علاج موضعي للفطريات


**Velosef 500mg caps**

**A.C : Cephradine**

قرص كل ٨ ساعات بعد الأكل ، الاستخدام : مضاد حيوي من الجيل الأول سيفالوسبورين

# روشتات قلب

## الروشتة الأولى



التخصص : أمراض القلب

الأصناف المكتوبة كالاتي

**Co-Dilatrol 25/12.5mg tab**

**A.C : Carvedilol+Hydrochlorothiazide**

قرص قبل الإفطار

الاستخدام : لعلاج الضغط حيث أنه يحتوي علي

**Hydrochlorothiazide (Diuretic)**



**Rositor 20mg tab**

**A.C : Rosuvastatin**

قرص بعد العشاء

يستخدم لعلاج الكوليسترول و خفض نسبة الدهون

**Windipine 10mg tab**

**A.C : Amlodipine**

قرص قبل العشاء

يستخدم لعلاج الضغط حيث أنه يعمل كـ

**Selective Calcium Channel Blocker**

**Examide 20mg tab**


**A.C : Torsemide**

قرص قبل الغذاء

يستخدم كـ

**Antihypertensive in CHF , (Loop Diuretic)**

## الروشتة الثانية



التخصص : قلب

التشخيص

**Chest pain**

الأصناف المكتوبة

**Feldene amp.**

**A.C : Piroxicam**

حقنة عضل مرتين يومياً

الاستخدام : حقنة مسكنة و مضادة للالتهابات

**Anuva 50mg tab**

**A.c : Diclofenac sodium**

قرص مرتين يومياً بعد الأكل

الاستخدام : مسكن و مضاد التهابات


## ملحوظة هامة

في هذه الروشنة سنلاحظ أن التشخيص ألم في الصدر و في هذه الحالة ممنوع إعطاء المسكنات لأنه ربما يكون الألم ناتج عن خلل في عضلة القلب أو وجود ذبحة صدرية و لكن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها إعطاء المسكنات هي

### Pericarditis

أو التهاب في الغشاء الذي يحيط بعضلة القلب ، ويتم التأكد من ذلك بعد عمل رسم قلب و التأكد أن النتيجة طبيعية عندئذ يكون الالتهاب في الغشاء نفسه الذي يغلف عضلة القلب

## الروشتة الثالثة



التخصص : أمراض القلب و الشرايين

الأصناف المكتوبة كالاتي

**Examide 5mg tab**

**A.C : Torsemide**

حبة علي الريق

استخدامه

**Antihypertensive (loop diuretic) in CHF**

**Plavix 75mg tab**

**A.C : Clopidogrel**

حبة صباحاً

استخدامه

**1-Prevention of stroke**

**2-Reduce atherosclerotic events**

**3-Prophylaxis of Myocardial Infarction**

**4-Coronary artery diseases**

**5-Peripheral vascular diseases**

**Marevan 3mg tab**

**A.C : Warfarin**

حبة يومياً مع عمل تحليل

**PT+INR**

كل ١٥ يوم

وهذا الأمر في غاية الخطورة وقد نبه إليه الطبيب المعالج

لأن هذا الدواء من الممكن أن يسبب نزيف شديد وبالأخص لكبار السن

لاضطراب الوظائف الكبدية لديهم و بالتالي يقل تكسير الوارفارين فتزداد نسبة سيولة الدم الأمر الذي يؤدي إلي مخاطر كبيرة علي صحة المريض إذا لم يتم تدارك الأمر

لذلك يُنصح بعمل هذا التحليل بصفة دورية للمرضي الذين يأخذون هذا الدواء

استخدامه : الوقاية من الجلطات

**Procoralan 5mg tab**

**A.C : Ivabradine**

نصف حبة مرتين

الاستخدام

**Anti-ischemic (Antianginal drug)**

**Entresto 100mg tab**

**A.C : Sacubitril+Valsartan**

نصف حبة مرتين

الاستخدام

**In Case Of Heart Failure ( reduce the risk of cardiovascular death and hospitalization for HF patients )**

**Atoreza 20/10 mg tab**

**A.C : Atorvastatin+Ezetimibe**

حبة مساء

الاستخدام : لخفض نسبة الكوليسترول

**Cardioton 300mg tab**

**A.C : Cratageus(Hawthorn)Extract**


حبة ٣ مرات

الاستخدام

**Heart failure , Ischemic heart disease , Hypertension , Senile cardiomyopathy**

# روشتات باطنة

## الروشتة الاولى



نواجه أحياناً روشتة صعبة الفهم فالأدوية المكتوبة فيها يصعب قراءتها ولكن مع كثرة التدريب و التعرض لهذه الروشتات أكثر من مرة سنستطيع قراءة هذا النوع من الروشتات

الأصناف المكتوبة كالآتي

### Trimed flu tab

A.C : Loratadine+Paracetamol+Pseudoephedrine

قرص كل ١٢ ساعة

يحتوي علي مضاد للحساسية و مسكن و مضاد للاحتقان لذلك يستخدم في أدوار البرد كذلك في التهاب الجيوب الأنفية

## **Cevamol eff.**

**A.C : Paracetamol+Vitamin C**

فوار مرة واحدة بعد الأكل

الاستخدام : فيتامين سي لرفع المناعة بالإضافة إلي باراسيتامول مسكن

## **Antodine 40mg tab**

**A.C : Famotidine**

قرص قبل الأكل صباحاً

الاستخدام : في حالات الحموضة و الارتجاع ، لقراءة موضوعاً كاملاً عن الحموضة و ارتجاع المرئ [من هنا](#)

## **Cefotax 1 gm vial**


**A.C : Cefotaxime**

حقنة عضل كل ١٢ ساعة

الاستخدام : مضاد حيوي واسع المجال



## الروشتة الثانية



التخصص : كبد و جهاز هضمي

الأصناف المكتوبة كالاتي

**Maxfol tab**

**A.C : L-Methylfolate**

قرص كل ١٢ ساعة

استخدامه : فوليك اسيد للوقاية من الانيميا ، كما أن له استخدامات أخرى لدي الحوامل

**To prevent infant spinal cord birth defects**

## **Cona-Adione chewable tab**

**A.C : Vitamin K**

قرصين بعد الغذاء

استخدامه

## **Fat soluble vitamin Antihemorrhagic**

## **Inderal 40mg tab**

**A.C : Propranolol**

نصف قرص كل ١٢ ساعة

استخدامه : لعلاج الضغط حيث أنه يعمل كـ

## **Beta blocker non-selective**

كما أنه يستخدم في حالات التوتر و الصداع النصفي وحالات عدم إنتظام ضربات القلب


## **Rowachol caps**

**A.C : Alpha pinene + Beta pinene + Camphene + Cineol + Menthol +  
Menthone**

كبسولة كل ٨ ساعات

استخدامه : لعلاج اضطرابات الكبد و المرارة و مهضم و في حالات حصوات المرارة

## الروشتة الثالثة



التخصص : باطنة

الأصناف المكتوبة

**Nexium 40mg tab**

**A.C : Esomeprazole**

قرص قبل العشاء

الاستخدام : لعلاج الحموضة و قرحة المعدة

يمكنكم قراءة موضوع كامل عن قرحة المعدة [من هنا](#)

**Rabepazole 20mg tab**

**A.C : Rabepazole sodium**

قرص قبل الغذاء

الاستخدام

**Peptic ulcer proton pump inhibitor**

## **Mucosta tab**

**A.C : Rebamipide**

قرص ٣ مرات يومياً

الاستخدام : تستخدم في حالات

## **Gastroduodenal ulcers and treatment of gastritis**

## **Ganaton 50mg tab**

**A.C : Itopride**

قرص ٣ مرات يومياً

الاستخدام : منظم لحركة الجهاز الهضمي

## **Colovatil tab**

**A.C : Mebeverine+Sulpiride**

قرص ٣ مرات يومياً

الاستخدام : لعلاج القولون العصبي المصاحب للقلق أو التوتر


## **Cholerose 20mg tab**

**A.C : Rosuvastatin**

قرص بعد العشاء

الاستخدام : لعلاج الكوليسترول ويمكنكم قراءة موضوع كامل عن أدوية الكوليسترول المختلفة [من هنا](#)

## الروشتة الرابعة



التخصص : باطنة

الأصناف المكتوبة كالاتي

**Amaglust 2/30mg tab**

**A.C : Glimepiride+Pioglitazone**

قرص قبل الغذاء يومياً و يكرر

الاستخدام

**Anti-diabetic (third generation sulfonylurea)**

**Stugeron tab**

**A.C : Cinnarizine**

قرص ٣ مرات بعد الأكل

الاستخدام

**Promote cerebral blood flow , so used in : Motion sickness , Vertigo , Vascular disorders (peripheral & cerebrovascular)**

**Aggrex 75mg tab**

**A.C : Acetylsalicylic Acid**

قرص بعد الغذاء باستمرار

الاستخدام : للوقاية من الجلطات بتحسين سيولة الدم

**Cholerose 20mg tab**

**A.C : Rosuvastatin**

قرص بعد العشاء باستمرار

الاستخدام : لعلاج الكوليسترول و خفض نسبة الدهون

# و في الختام

انتظروا روشتات جديدة في جميع الأقسام شهرياً حيث يتم تطوير الكتاب بصفة مستمرة و إضافة المزيد من الروشتات .

هذه الروشتات قمنا بتجميعها من مصادر مختلفة و مراجعتها بعناية حرصاً منا علي تزويدكم بالمعلومات الطبية الصحيحة .

تلك المعلومات التي تبني خبرة الصيدلي وتضيف إليه رونق خاص به عندما يكون علي علم كافٍ بكل شئ داخل الصيدلية.

وندعو الله أن نكون قد وفقنا في هذا العمل المتواضع و بإذن الله سيتم إضافة تجميعات جديدة في قسم الروشتات قريباً.

**Best wishes , Pharmacy Cafe Team**

**Subscribe Now to our YOUTUBE channel to know more about diseases and medicine.**